



PREVALENCIA DE SÍFILIS GESTACIONAL EN HOSPITALES DE REFERENCIA DEL ALTO PARANA, AÑO 2018

BENÍTEZ D.¹; DÁVALOS R.¹; DUARTE D.¹; VERA J.²; ORTIGOZA M.³

1. Estudiante. Carrera: Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud-UPE.
2. Tutora temática. Carrera, Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud-UPE
3. Tutora Metodológica. Facultad de Ciencias de la Salud-UPE.

Introducción :

El sífilis es una infección crónica causada por *Treponema pallidum*, subespecie *pallidum*, la cual se transmite por vía sexual y se caracteriza por fases de actividad separadas por periodos de latencia. La prevalencia en Alto Paraná es del 6 % de enfermedades infecto contagiosas, mientras que en las demás regiones se llega entre 1 a 3%.

Objetivo:

Comprobar la prevalencia de sífilis gestacional según datos registrados en los Hospitales Distritales y el Hospital Regional de Ciudad del Este, en el 2018

Materiales y métodos:

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Como fuente de datos se utilizó las fichas clínicas de gestantes con diagnóstico positivo de sífilis, registradas en el programa PRONASIDA, de los Hospitales de Ciudad del Este (Regional) y de las ciudades de Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias (distritales), desde enero a diciembre del año 2018.

Resultados: En los Hospitales de referencia del Alto Paraná del año 2018, acudieron 8.107 gestantes para su control prenatal y se realizaron el test rápido de VDRL, de los cuales fueron registradas en el programa de PRONASIDA, 504 gestantes con diagnóstico positivos de sífilis y 7603 dieron VDRL negativo. El 3% en el Hospital Distrital de Minga Guazú; el 6% se registró en el Hospital Regional de Ciudad del Este, el 7% en el Hospital Distrital de Presidente Franco y el 10% en el Hospital Distrital de Hernandarias, el que registró mayor número de casos de sífilis en gestantes. En cuanto a la edad gestacional del diagnóstico de sífilis en los cuatro hospitales prevalecen en el 3° trimestre (27 a 40 sem). En cuanto el rango de edad, se encontró que en los Hospitales de Hernandarias, Presidente Franco y Regional fueron entre 19 a 23 años; mientras que en el hospital de Minga Guazú fue entre 24 a 28 años. La prevalencia en gestantes con sífilis es de 6.2% en los hospitales de Alto Paraná en el año 2018.

Tabla 1: Gestantes con diagnóstico positivo de VRDL registrados en el programa de PRONASIDA de los Hospitales Distritales Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná-Año 2018 .

Servicios	Positivos	%	Negativos	%	Total
Hospital Distrital Presidente Franco	103	7	1480	93	1583
Hospital Distrital de Hernandarias	186	10	1662	90	1848
Hospital Distrital de Minga Guazú	52	3	1823	97	1875
Hospital Regional Ciudad del Este	163	6	2638	94	2801
Total	504	6,2	7603	94	8107

Tabla 2: Diferencias entre los datos obtenidos de los centros hospitalarios estudiados.

Servicios	Rango de edad	%	Edad Gestacional	%	Positivos	%
Hospital Distrital Presidente Franco	19 a 23	27	3er trimestre (27 a 40 sem)	39	103	7
Hospital Distrital de Hernandarias	19 a 23	26	3er trimestre (27 a 40 sem)	39	186	10
Hospital Distrital de Minga Guazú	24 a 28	27	3er trimestre (27 a 40 sem)	42	52	3
Hospital Regional Ciudad del Este	19 a 23	36	3er trimestre (27 a 40 sem)	46	163	6

Conclusión:

La prevalencia en gestantes con sífilis en los Hospitales de Alto Paraná fue alta. Esta enfermedad puede ocasionar daños irreversibles al feto en formación, por lo que se debe insistir en la educación sobre las enfermedades de transmisión sexual y la gestión del autocuidado en las embarazadas y mujeres en edad fértil.

Bibliografía

•Harrison, Dan L. Longo, MD, Anthony S. Fauci, MD, Dennis L. Kasper, MD, Stephen L. Hausheer, MD, J. Larry Jameson, MD, PhD, Joseph Loscalzo, MD, PhD. (2016). Principio de Medicina Interna 18va edición. MCGRAW-HILL México (Pag) 1380-1388.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social . (2015). Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades . Asunción Paraguay .